

# واکسن های سرخچه، اریون، سرخچه آلمانی

اطلاعاتی که لازم است در باره آنها بدانید

این سنتین پیشنهاد شده هستند. ولی کودکان می توانند در هر سنی دومین واکسن خود را پس از ۲۸ روز بعد از اولین واکسن بزنند.

بعضی بزرگسالان نیز باید از واکسن MMR استفاده کنند:  
بطور کلی، افراد بالاتر از سن ۲۸ سالگی که پس از سال ۱۹۵۶ بدنیا آمده اند، باید اقلای واکسن بزنند مگر آنکه بتوانند نشان بدهند که واکسن را زده اند و یا اینکه به این بیماریها مبتلا شده اند.

در اینمورد اطلاعات بیشتر را از دکتر یا پرستار خود بخواهید.

واکسن MMR را می توان همزمان با واکسنهای دیگر تزریق نصود.

## بعضی اشخاص نباید واکسن MMR بزنند یا اینکه باید صبر کنند

۳

• اشخاصی که حساسیت شدید در حد مرگ ، نسبت به ژلاتین، آنتی بیوتیک نیومایسین و یا خود واکسن MMR دارند که در دفعه اول تزریق آن نشان داده شده است ، نباید این واکسن را بزنند.

• اشخاصی که بطور معتدل یا شدید در زمان تعیین شده برای واکسیناسیون مرضی هستند نباید از واکسن MMR استفاده نمایند و باید تا زمان بهبودی کامل صبر کنند.

• زنان حامله باید صبر کنند و پس از فارغ شدن این واکسن را بزنند. زنان می بایستی تا ۴ هفته بعد از زدن واکسن MMR از حامله شدن خودداری کنند.

• بعضی اشخاص باید با دکتر خود در مورد تزریق واکسن MMR مشورت کنند. این اشخاص بشرح زیر هستند:

- اشخاص مبتلا به HIV/AIDS و یا هرگونه بیماری که قوای دفاعی بدن را کم می کند

- اشخاصی که برای مدت دو هفتگی یا بیشتر دارو هایی استفاده می کنند که قوای دفاعی بدن را پایین می آورد مانند استروپرید

- اشخاص مبتلا به هرگونه سرطان

- اشخاص تحت درمان سرطان از طریق پرتو مجهول (X-ray) و داروهای مخصوص سرطان

- اشخاصی که در هر زمانی ناراحتی خونی (کمبود سلولهای خون) داشته اند

## ۱ چرا باید واکسن زد؟

سرخچه، اریون و سرخچه آلمانی بیماری های خطرناک و وخیمی هستند.

### سرخچه

- ویروس سرخچه باعث بروز خارش، سرفه، آب آمدن از بینی، سوزش و خارش چشم و تب میشود.
- همچنین می تواند باعث عفونت گوش، ذات الیه، صرع (تکانهای شدید و خیره شدن)، صدمه مغزی و مرگ نیز بشود.

### اریون

- ویروس اریون موجب تب، سرد رد و درم غدد ترشحی میشود.
- همچنین می تواند باعث ناشنوایی، منژیت (عفونت در مغز و روکش نخاع)، درد ردنگ بیضه یا تخمدان و بندرت، مرگ بشود.

### سرخچه آلمانی

• سرخچه آلمانی باعث بروز خارش ، تب خفیف ، درد استخوانان (بخصوص در زنها) میشود .

• اگر زنی در زمان حاملگی دچار سرخچه آلمانی بشود، به احتمال زیاد سقط جنین خواهد کرد و یا نوزاد ناقص به دنیا خواهد آمد.

شما و فرزندتان می توانید در اثر تماس با کسانی که به این بیماریها مبتلا هستند بیمار شوید. میکرب این بیماری ها از طریق هوا از شخص مبتلا به اشخاص دیگر منتقل می شود.

واکسن سرخچه، اریون و سرخچه آلمانی MMR می تواند از این بیماری ها جلوگیری کند.

## ۲ چه کسی باید واکسن MMR استفاده کند

و در چه زمانی؟

کودکان باید دو مرتبه از واکسن MMR استفاده کنند و آن را تزریق نمایند.

- ✓ اولین بار در سن ۱۲ تا ۱۵ ماهگی
- ✓ دومین بار در سن ۴ تا ۶ سالگی.

بریدگی، ضعف، ضربان شدید قلب یا سرگیجه معمولاً به فاصله چند دقیقه یا چند ساعت پس از واکسیناسیون اتفاق می‌افتد. اگر تپ بالا یا حالت صرع اتفاق بیافتد، معمولاً به فاصله ۱ تا ۲ هفته پس از تزریق واکسن است.

### چه باید کرد؟

- با دکتر تماس بگیرید یا فوراً شخص را به دکتر برسانید.
- به دکتر خود اطلاع بدهید که چه پیش آمده، در چه زمانی اتفاق افتاده و واکسیناسیون در چه زمانی بوده است.
- از دکتر، پرستار یا سازمان بهداشتی بخواهید تا فرم گزارش پیشامد زیان اور حاصله از واکسن (VAERS) را پر کند. یا خودتان با VAERS با شماره تلفن ۱-۸۰۰-۸۲۲-۷۹۶۷ یا آدرس کامپیوتوری آنها <http://www.vaers.org> دیدن کنید.

## برنامه ملی غرامت صدمات ناشی از واکسیناسیون

۶

در موارد خیلی معنود که شما یا فرزندتان عکس العمل شدیدی نسبت به یک واکسن داشته باشید، یک برنامه دولتی ایجاد شده است که به پرداخت مخارج درمان اشخاصی که آسیب دیده اند کمک می‌کند.

برای جزئیات در مورد برنامه ملی غرامت صدمات ناشی از واکسیناسیون با تلفن ۱-۸۰۰-۳۳۸-۲۳۸۲ تماس بگیرید یا از آدرس کامپیوتوری این برنامه <http://www.hrsa.gov/osp/vicp> دیدن کنید.

## چگونه می‌توانید بیشتر بدانید؟

۷

- از دکتر یا پرستار خود راجع به این واکسن بپرسید. آنها می‌توانند مجموعه فرمها و اطلاعات چاپ شده راجع به این واکسن را به شما بدهند و یا برای اطلاع بیشتر منابع اطلاعاتی دیگری را معرفی کنند.
- با سازمان بهداشت محلی یا ایالت خود در مورد برنامه مصونیت تماس بگیرید.
- با مرکز کنترل و جلوگیری بیماری (CDC) تماس بگیرید:  
Call 1-800-4636 (1-800-CDC-INFO)  
- از آدرس کامپیوتوری برنامه ملی مصونیت <http://www.cdc.gov/nip> دیدن کنید



**U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES**  
Centers for Disease Control and Prevention  
National Immunization Program

Vaccine Information Statement  
MMR IMM-375ML - Farsi (1/15/03)      42 U.S.C. § 300aa-26

Translated by Transcend Translations, Davis, CA

• اشخاصی که انتقال خون یا انتقال هرگونه محصول خونی دیگر داشته اند باید از دکتر خود سوال کنند که در چه زمانی امکان دارد واکسن MMR را بزنند.

اطلاعات بیشتر در این زمینه را از دکتر یا پرستار خود بپرسید.

## خطرات واکسن MMR چیست؟

یک واکسن، مانند هرگونه داروی دیگر می‌تواند موجب ایجاد مشکلات جدی مانند عکس العمل شدید یا حساسیت شود. احتمال اینکه واکسن MMR باعث صدمه شدید و یا مرگ بشود، خیلی کم است.

خطر تزریق واکسن MMR از ابتلاء به خود این سه بیماری خیلی کمتر است.

اکثریت کسانی که این واکسن را می‌زنند، اشکالی با آن ندارند.

### اشکالات خفیف

- تب (از هر ۶ نفر، یک نفر)
  - خارش (از هر ۲۰ نفر، یک نفر)
  - ورم غدد ترشحی در گردن یا گونه‌ها (بندرت)
- اگر این اشکالات اتفاق بیافتد، معمولاً در فاصله ۷ تا ۱۲ روز بعد از واکسیناسیون اتفاق می‌افتد. معمولاً این اشکالات پس از دومین واکسیناسیون، پیش می‌آیند.

### اشکالات معتدل

- حالت صرع که از تب ایجاد می‌شود (تکانهای شدید و خیره شدن)  
(از هر ۲۰۰۰ دفعه واکسن، ۱ دفعه)
- درد موقتی و خشکی مفصلها، اکثراً در جوانان یا زنان بزرگسال (از هر ۴ نفر، ۱ نفر)
- کمبود موقتی سلولهای خون، که احتمالاً باعث بهم خوردن وضعیت خونی می‌شود (از هر ۲۰۰۰۰ دفعه واکسن، ۱ دفعه)

### اشکالات شدید (خیلی بندرت)

- حساسیت شدید (از هر ۱ میلیون دفعه واکسن، کمتر از ۱ دفعه)
- چندین اشکال جدی نیز تاکنون بعد از زدن واکسن برای کودکان ایجاد شده است. ولی چون این اتفاقات بسیار بندرت اتفاق می‌افتد، کارشناسان مطمئن نیستند که این اشکالات در اثر تزریق واکسن بوجود آمده باشد، این اشکالات شامل:

  - ڈناشناواری
  - تصرع طولانی مدت، اغما
  - ڈصدمه مغزی دائمی

## اگر اشکالات معتدل یا شدیدی ایجاد شوند؟

۵

### باید موظب چه بود؟

هرگونه موقعیت غیر عادی، مانند تب زیاد یا تغییر رفتار، علیم حساسیت شدید شامل تنگی نفس، صدا گرفتنگی یا خس خس کردن، کهیر، رنگ